

## Syntomidæ

### *Eucereon formosum*, n. sp.

44 millimètres. Dessus des supérieures, blanc laiteux, semé de petites taches noires, autour desquelles le blanc se teinte très légèrement. Ces taches sont ainsi réparties : cinq sur la côte, assez également espacées; une subbasilaire centrale; une cellulaire centrale; deux en avant de la discocellulaire, et deux après, dont la première centrale entre 5 et 6, la seconde entre 6 et 7; deux autres plus loin entre 5 et 7, faisant suite à trois toutes petites taches partant du dessous de la discocellulaire sous la 3, puis entre 3 et 4, 4 et 5; une entre 7 et 8; six terminales d'avant l'angle interne à la 7: cinq subterminales de la 5 au bord interne; la dernière reliée à une tache au-dessus de la 1, accompagné d'une seconde en dessous de la 2; une subbasilaire en dessous de la 1; enfin, deux extrabasilaires entre la 1 et la médiane; frange blanche. Dessus des inférieures enfumé, la côte légèrement renflée au départ, la frange blanchâtre; dessous des quatre ailes enfumé, une partie des taches du dessus reparaisant, la région abdominale des secondes ailes blanchissant; les franges blanchâtres. Palpes noirs et blancs, le troisième article blanc; front noir et blanc; vertex blanc; collier blanc avec quatre points noirs et finement liséré de rose en avant; thorax blanc avec quatre points noirs; abdomen couvert de longs poils roses au départ, rose, plus vif en dessus, avec une rangée dorsale, deux rangées latérales et une ventrale de traits noirs sous chaque anneau, le dernier segment noir; pattes roses et noir coupé de blanc.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou Sud-Est; saison des pluies; un ♂.