

Fühler des ♂ kamm- des ♀ sägezahnig, schwarzbraun, der Schaft beim ♂ oben bis gegen die Mitte weiss, beim ♀ nur die zwei ersten Fühlerglieder weisslich. Palpen schwarzbraun. Kopf schwärzlichbraun, Scheitel weisslich gerandet, gegen den Halskragen durch einen ziegelrothen Streif getrennt. Halskragen schwarzgrau, vorn fein weisslich gesäumt. Thorax weisslich, Schulterdecke schwärzlich, aussen und an der Spitze weisslich, Schildchen schwärzlich. Hinterleib schwärzlich graubraun, beim ♂ die vorletzten drei Segmente blassroth, mit je einem schwarzen Punkt auf der Mitte, unten bei beiden Geschlechtern blassroth, mit schwärzlichbraunem Seitenstreif und solcher Spitze.

Möschler, 1878; Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27 (Abh.): 643

Brust schwarzbraun, in der Mitte und nach hinten röthlich behaart. Hüften ziegelroth, Vorderschenkel dunkelbraun, innen bis über die Mitte weisslich. Mittelschenkel bis über die Mitte, Hinterschenkel nur an der Wurzel ziegelroth, Schienen und Tarsen dunkelbraun.

Vorderflügel beim ♂ gelblichweiss, beim ♀ weiss, an der Wurzel drei schwarze Flecken, im Wurzelfelde ein aus vier solchen Flecken gebildeter Querstreif. Der oberste, am Vorderrande stehende Fleck länglich, unter ihm ein Punkt; die beiden letzten Flecken stehen dicht über einander, nur durch die Dorsale getrennt in Zelle 1a und 1b. Durch die Flügelmitte zieht eine aus zwei Fleckenreihen gebildete, breite Binde, welche vom Vorderrande bis zur Subdorsale schmal verläuft, von da bis zum Innenwinkel durch die langgezogenen Flecken der Aussenreihe, doppelte Breite zeigt. Im Saumfeld zwei parallel verlaufende und nur durch einen schmalen Streif der Grundfarbe getrennte Fleckenreihen. Die innere besteht nur aus drei Flecken, sie reicht vom Vorderrande bis in Zelle 5, die äussere, dicht am Saum ziehende Reihe, besteht aus sieben Flecken und schliesst sich am Innenwinkel an die Mittelbinde, ihr letzter Fleck in Zelle 2 ist etwas nach innen gerückt.

Hinterflügel im Wurzel- und zuweilen auch im Mittelfelde weiss, fast durchsichtig, Saum und Innenrand breit schwärzlich.

Vorderflügel unten schwarzbraun, im Wurzelfeld weiss mit schwarzbrauner Einmischung, in der Mitte der Mittelzelle ein schwarzbraunes Fleckchen. Hinter der Mitte eine aus vier Flecken gebildete, in Zelle 4 winklich weit saumwärts tretende weisse Binde.

Hinterflügel wie oben, nur matter gefärbt. Fransen weisslich, an der Wurzel grau. 26—32, 6—7 Mm.

Zwei ♂, ein ♀ von Paramaribo.